

SOUFFLET AGRO VESTI SA POLJA

1

Da li **korovi**
takođe **brzo**
rastu u vašim
poljima
žitarica?

Sa toplijim danima, korov su se pojavili na poljima.

Azotna prihrana podstiče njihov razvoj i čini korov jačim.

Važno je kontrolisati korov **što je pre moguće**: oni troše azot koji ste platili!



Možete sačekati i primeniti herbicid zajedno sa fungicidom ... ali do tada, korovi će već potrošiti azot i biće još jači.

**Da biste povećali svoj prinos, ne čekajte
REAUGUJTE ODMAH**

Još niste probali naš paket herbicida?

JEDAN TRETMAN. UKUPNA KOTROLA ŠIROKOLISNIH KOROVA.

CROSSEFIRE

Aktivna materija:

Tifensulfuron-metil 682 g/kg

Metsulfuron-metil 68 g/kg

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:

Pšenica 0,075 kg/ha (BBCH 13-39);

Prolećni ječam 0,060 kg/ha (BBCH 13-39)

60 g/ha

BONACA® EC

Aktivna materija:

Fluroksipir 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:

Zimske žitarice 0,6–1,2 l/ha (BBCH 13-39);

Prolećne žitarice 0,4–0,8 l/ha (BBCH 13-39);

Kukuruz 0,8 l/ha (BBCH 13-16)

0,3 l/ha

ALTEOX T PRIMA

Aktivna materija:

Izodecilalkoholetoksilat 900 g/l

Registrovani usevi i količina:

0,2 l/100 litara vode

0,3 l/ha na 150 lit vode



Efikasnost prolećne primene CROSSEFIRE + BONACA na Capsella bursa-pastoris i vrste Veronica, procenjena 15 dana nakon tretmana.

Tri komplementarne aktivne materije za suzbijanje korova širokog spektra.

Fleksibilno vreme primene (od faze 3. lista do lista zastavičara).

Do 90 dana dugotrajne efikasnosti na prolećnim korovima.

Kontroliše čak i najteže vrste kao što su Veronica spp., Papaver rhoeas, Matricaria chamomilla i Galium spp.



NAŠI TEHNIČKI SAVETI



Primenite od faze 3. lista do faze lista zastavičara za maksimalnu sigurnost i efikasnost useva.

Tretirajte kada temperaturne razlike između dana i noći ostanu ispod 15°C (idealni opseg: 5-20°C).

Uvek koristite sa adjuvantom Alteox T Prima za optimizaciju performansi.

Nanesite kada je vlažnost vazduha iznad 70%, obično rano ujutro ili noću za najbolje rezultate.

Ne mešajte sa regulatorima rasta.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Veronica sp.	Myosotis arvensis	Polygonum aviculare	Solanum nigrum	Rumex crispus	Fumaria officinalis
Stellaria media	Capsella bursa-pastoris	Cirsium arvense	Sinapis arvensis	Rumex obtusifolius	Lamium purpureum
Viola arvensis	Geranium sp	Daucus carota	Raphanus raphanistrum	Senecio vulgaris	Sonchus arvensis
Papaver rhoeas	Galium aparine	Cannabis sativa	Persicaria maculosa	Sisymbrium officinale	
Matricaria chamomilla	Brassica sp.	Chenopodium album	Brassica napus	Centaurea cyanus	
Alchemilla xanthochlora	Fallopia convolvulus	Geranium sp.	Vicia sativa	Cirsium arvense	


veoma efikasno

efikasno

srednje efikasno

neefikasno

APSORPCIJA NA DVA NAČINA: PREKO LISTA I PUTEM KORENA



Fluroxipir: Usvajanje preko lista

Metsulfuron-metil: Folijarni i unos putem korena (dugotrajnost delovanja : 90 dana).

Tifensulfuron-metil: Usvajanje preko lista