

Sećate se proleća 2023? Žitarice su se suočile sa visokim pritiskom bolesti. Prošla godina je bila umerena.

Svaka godina je drugačija, i teško je predvideti koji proizvodi će nam trebati.

Soufflet vam olakšava život i dolazi sa savršenom ponudom vrednosti za novac:

- Visokokvalitetni proizvodi sa visokom efikasnošću protiv najčešćih bolesti žitarica
- Veoma atraktivna cena po hektaru!



Prestanite da birate između cene i kvaliteta.

NABAVITE OBOJE SA NAŠIM T1 FUNGICIDNIM PAKETOM.

Asorbital®
FORMULATION TECHNOLOGY

STARPRO® 430SC
Aktivna materija:
Tebukonazol 430 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,6 l/ha (BBCH 31-59),
Ječam 0,6 l/ha, Uljana repica 0,4 l/ha

0,4 l/ha



SORATEL®
Aktivna materija:
Protiokonazol 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,6-0,8 l/ha
Ječam 0,6-0,8 l/ha

0,4 l/ha

Pametnan izbor za upravljanje fuzariozama

PŠENICA

Pepelnica
Žuta rđa
Smeđa rđa
Septorioza
Fuzarioza
Trulež korena

JEČAM

Pepelnica
Rđa ječma
Helmintosporioza
Rinhosporioza
Fuzarioza
Ramularia

veoma efikasno

efikasno

srednje efikasno

neefikasno

Maksimizirajte kontrolu bolesti sa dvostrukim triazolima i Asorbital® tehnologijom:


Dvostruki triazoli: Snažna kontrola Fusarium, žute i smeđe rđe

Fleksibilan tajming: Prskajte u T1 ili T2

SORATEL® (Asorbital®): Brza apsorpcija i sistemsko kretanje obezbeđuju dugotrajniju, dublju zaštitu svakog lista

STARPRO® 430 SC: Odlična kompatibilnost sa drugim sredstvima


SORATEL® protiv generičkog protiokonazola



Soratel tehnologija obezbeđuje bržu apsorpciju i sistemsko delovanje, dajući bolju efikasnost od standardnog protiokonazola (vidi levi grafik).



NAŠI TEHNIČKI SAVETI




Kod žitarica, poslednjih 5 listova je ključno za prinos.

Ne primenjujte svoj T1 fungicid prerano: idealno vreme je između 1. i 3. čvora.

Primenjeni ranije, rizikujete izgubljeni proizvod i nezaštićene listove do T2.

Prskajte kada je temperature 5-25 °C sa vlagom iznad 70% (idealno rano ujutro) i bez kiše u roku od 2 sata.



U žitaricama, poslednja tri do pet listova, posebno list zastave, ključni su za proizvodnju žitarica. Primena T1 fungicida prerano (pre prvog čvora, crveni primer) štiti usev za 15-21 dan, ali nakon toga, važni gornji listovi ostaju nezaštićeni do T2 u fazi zastave lista. Ovo stvara jaz zaštite, tokom kojeg bolesti poput rđe ili septorije mogu smanjiti prinos.

Da bi se izbegao ovaj problem, T1 fungicid treba naneti između 1. i 3. nodusa. U ovom trenutku, proizvod štiti ključne listove tokom njihovog razvoja, obezbeđujući jaču kontrolu bolesti i čuvajući potencijal prinosa.