

SOUFFLET AGRO VESTI SA POLJA

3

Uporno prisustvo
sirka (**Sorghum
halepense**)
u kukuruzu uprkos
primeni herbicida?
Ovo može ukazivati
na populacije
rezistentne na ALS
herbicide.

Zajedno sa kompanijom Bayer, Soufflet je razvio specifičan herbicidni program za kukuruz namenjen suzbijanju sirka (*Sorghum halepense*) rezistentnog na ALS inhibitore.

Kupite 3 pakovanja i dobijate besplatan test koji potvrđuje rezistentnost na herbicide i pokazuje na koje aktivne materije su vaše korove otporne.

UKOLIKO KUPITE
3 PAKOVANJA



DOBIJATE JEDAN
BESPLATAN DNK
TEST ZA OTPORNOST
SORGHUM HALEPENSE
(VREDNOST 300 EURA).



Merlin Duo Flexx i Capreno
pametan izbor za suzbijanje
rezistentnog *Sorghum
halepense*!

		Terbutilazin g/ha	Isoksaflutol g/ha	Tiencarbazon metil g/ha	Tembotrion g/ha
MERLIN DUO 1.8 l/ha	Isoksaflutol 50 g/l Terbutilazin 375 g/l	675	90	0	
CAPRENO 0.3 l/ha	Tembotrion 345 g/l Tiencarbazon 68 g/l	0	0	20,4	103,5

Jedino rešenje koje vam je potrebno za suzbijanje sirka (*Sorghum halepense*) na vašim parcelama!

MERLIN® DUO FLEXX

Aktivna materija:
Terbutilazin 375 g/l
Izoksafutol 50 g/l
Ciprosulfamid 50 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 0,4 l/ha
(BBCH 00-13 nicanja do 3. lista)

1,5-2 l/ha



CAPRENO

Aktivna materija:
Tembotrion 345 g/l
Tienkarbazon - metil 68 g/l
Izoksadifen - etil 134 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 0,25-0,3 l/ha
(BBCH 13-16 od 3. do 6. lista).

0,3 l/ha



MERO

Aktivna materija:
smeša metilestara ulja
uljane repice 733 g/l

Registrovani usevi:
Primenjuje se uz herbicide,
u količini 1-1,75l/ha.

1 l/ha

Herbicid primenjen pre nicanja korova ŠIROKOLISNI KOROVI

Amaranthus retroflexus	Capsella bursa-pastoris
Chenopodium album	Matricaria chamomilla
Datura stramonium	Sinapis arvensis
Abutilon theophrasti	Anagalis arvensis
Solanum nigrum	Mercurialis annua
Portulaca oleracea	Veronica sp
Galinsoga parviflora	Vicia spp.
Ambrosia artemisiifolia	Falopia convolvulus
Polygonum spp	
Euphorbia spp.	
Raphanus raphanistrum	

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli	
Digitaria sanguinalis	
Setaria spp.	
Panicum spp	
Sorghum halepense (Efikasnost zavisi od pritiska korova)	veoma efikasno
	efikasno
Lolium spp.	srednje efikasno

Herbicid primenjen pre nicanja korova ŠIROKOLISNI KOROVI

Abutilon theophrasti	Chenopodium hybridum
Amaranthus retroflexus	Chenopodium polyspermum
Ambrosia artemisiifolia	Datura stramonium
Lysimachia arvensis	Lamium amplexicaule
Brassica napus	Lamium purpureum
Capsella bursa-pastoris	Matricaria chamomilla
Centaurea cyanus	Fallopia convolvulus
Chenopodium album	Persicaria lapathifolia
Persicaria maculosa	Fumaria officinalis
Rumex	Veronica arvensis
Solanum nigrum	Xanthium strumarium
Sonchus arvensis	Cirsium arvense
Stellaria media	Galium aparine
Veronica agrestis	Veronica hederifolia
Viola arvensis	Mercurialis annua
Convolvulus arvensis	Veronica persica

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli	Digitaria sanguinalis	veoma efikasno
Panicum spp	Sorghum halepense	efikasno
Setaria spp.	Poa annua	srednje efikasno
		neefikasno

Premium herbicidna tehnologija — pametno rešenje za upravljanje rezistentnošću sirka (*Sorghum halepense*):

Dvojno rešenje za primenu pre nicanja: Terbutilazin obezbeđuje snažnu kontrolu širokolisnih korova, dok izoksafutol proširuje spektar delovanja dodatnom efikasnošću na širokolisne i uskolisne korove. Pojačava suzbijanje sirka (*Sorghum halepense*) i pruža dugotrajnu rezidualnu zaštitu zahvaljujući ponovnoj aktivaciji nakon padavina.

Dvojno rešenje za primenu posle nicanja: Visoko koncentrovana formulacija tembotriona (103 g/ha) obezbeđuje snažnu kontrolu već razvijenog sirka (*Sorghum halepense*), dok tienkarbazon-metil proširuje spektar delovanja i pojačava upravljanje rezistentnošću zahvaljujući višestrukim mehanizmima delovanja.



NAŠI TEHNIČKI SAVETI



Isoxaflutole (MERLIN DUO FLEXX):

Primena pre nicanja ili u ranom porastu. Ovaj ključni početni tretman obezbeđuje ranu kontrolu korova i dugotrajnu rezidualnu aktivnost. Ne preskačite ga.

Tembotrione (CAPRENO):

Obezbeđuje visoku dozu tembotriona za snažnu post-emergentnu kontrolu, posebno sirka (*Sorghum halepense*). Primena u ranim jutarnjim satima: Veća vlažnost vazduha poboljšava zadržavanje kapi i usvajanje preko lista.

Uvek dodati MERO (uljni okvašivač):

U kombinaciji sa CAPRENO, MERO omogućava da prskanje prodre kroz voštanu kutikulu lista, što rezultira bržom apsorpcijom i boljom translokacijom u biljci. Bez MERO adjuvanta, efikasnost tretmana može značajno opasti.

Sledite kompletan program tretmana:

Kombinovanje pre-emergentnih i post-emergentnih aplikacija obezbeđuje čistije parcele i štiti potencijal prinosa tokom cele sezone.

Struktura Lista i Prodiranje Emulzije

